

Empfohlenes Impflalter	Impfung gegen	SÄUGLINGE UND KLEINKINDER				
		Wundstarrkrampf (Tetanus)	Diphtherie	Keuchhusten (Pertussis)	Kinderlähmung (Poliomyelitis)	Haemophilus influenzae b (Hib)
Alter in Monaten	Geburt					
	2	G 1.	G 1.	G 1.	G 1.	G 1.
	3	G 2.	G 2.	G 2.	G 2. <sup>a)</sup>	G 2. <sup>a)</sup>
	4	G 3.	G 3.	G 3.	G 3.	G 3.
	11-14	G 4.	G 4.	G 4.	G 4.	G 4.
	15-23					
Alter in Jahren	KINDER UND JUGENDLICHE					
	5-6	A	A	A		
	9-17	A	A	A	A	
	ERWACHSENE UND SENIOREN					
	ab 18					
	ab 60	A <sup>b)</sup>	A <sup>b)</sup>	A <sup>a)</sup>		

- A Auffrischimpfung  
 S Standardimpfung: Empfohlen für bestimmte Altersgruppen  
 G Grundimmunisierung
- Bei Einzelimpfstoffen und Impfstoffen ohne Keuchhustenanteil kann diese Dosis entfallen
  - Auffrischimpfung alle 10 Jahre
  - Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat
  - Bei Verwendung eines Mumps-Masern-Röteln-Windpocken-Impfstoffes: Gabe einer 2. Dosis

Empfohlenes Impflalter	Impfung gegen	SÄUGLINGE UND KLEINKINDER						
		Hepatitis B	Masern, Mumps, Röteln	Windpocken (Varizellen)	Meningokokken	Pneumokokken	Influenza (Grippe)	Humane Papillomviren
Alter in Monaten	Geburt							
	2	G 1.				G 1.		
	3	G 2. <sup>a)</sup>				G 2.		
	4	G 3.				G 3.		
	11-14	G 4.	G 1.	G 1.	G 1. <sup>c)</sup>	G 4.		
	15-23		G 2.	G 2.				
Alter in Jahren	KINDER UND JUGENDLICHE							
	5-6							
	9-17	G <sup>h)</sup>		S <sup>e)</sup>				G <sup>f)</sup>
	ERWACHSENE UND SENIOREN							
	ab 18							
	ab 60					S	S <sup>g)</sup>	

- Impfung von Jugendlichen ohne Windpockenerkrankung oder -impfung
- Für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren
- Jährlich mit aktuellem Impfstoff
- Für alle Jugendlichen, die bisher nicht geimpft wurden bzw. Komplettierung eines noch unvollständigen Impfschutzes
- Die nächste fällige Tetanus-Diphtherie-(Td)-Impfung soll einmalig mit einem Td-Pertussis-Poliomyelitis-Impfstoff erfolgen



Central Krankenversicherung AG  
 Hansaring 40-50 • 50670 Köln  
 Telefon +49 (0)221 1636-0  
 Fax +49 (0)221 1636-200

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.central.de](http://www.central.de)

- Hinweise:
- Die angegebenen Intervalle zwischen den einzelnen Impfungen sollten eingehalten werden, damit der Impfschutz vollständig aufgebaut werden kann.
  - Ausführliche Informationen zu Impfungen, zeitlichen Mindestabständen und Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie von Ihrem behandelnden Arzt.

# Impfkalender

nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)