



Regelmäßige Impfungen schützen

Nie wieder eine Impfung vergessen: Der Central Impfkalender bietet einen praktischen Überblick über die Schutzimpfungen bei Säuglingen, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO, Stand: Juli 2009).

Hinweise:

- Die angegebenen Intervalle zwischen den einzelnen Impfungen sollten eingehalten werden, damit der Impfschutz vollständig aufgebaut werden kann.
- Ausführliche Informationen zu Impfungen, zeitlichen Mindestabständen und Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie von Ihrem behandelnden Arzt.

Empfohlenes Implanter	Impfung gegen	SÄUGLINGE UND KLEINKINDER											
		Wundstarr- krampf (Tetanus)	Diphtherie	Keuchhusten (Pertussis)	Kinderlähmung (Poliomyelitis)	Haemophilus influenzae b (Hib)	Hepatitis B	Masern, Mumps, Röteln	Windpocken (Varizellen)	Meningokokken	Pneumokokken	Influenza (Grippe)	Humane Papillomviren
Alter in Monaten	Geburt												
	2	G 1.	G 1.	G 1.	G 1.	G 1.	G 1.				G 1.		
	3	G 2.	G 2.	G 2.	G 2. ^{a)}	G 2. ^{a)}	G 2. ^{a)}				G 2.		
	4	G 3.	G 3.	G 3.	G 3.	G 3.	G 3.				G 3.		
	11-14	G 4.	G 4.	G 4.	G 4.	G 4.	G 4.	G 1.	G 1.	G 1. ^{c)}	G 4.		
Alter in Jahren	15-23							G 2.	G 2.				
	KINDER UND JUGENDLICHE												
	5-6	A	A	A									
	9-17	A	A	A	A		G ^{h)}		S ^{e)}				G ^{l)}
ERWACHSENE UND SENIOREN													
ab 18													
ab 60	A ^{b)}	A ^{b)}	A ^{k)}							S	S ^{o)}		

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung: Empfohlen für bestimmte Altersgruppen

G Grundimmunisierung

a) Bei Einzelimpfstoffen und Impfstoffen ohne Keuchhustenteil kann diese Dosis entfallen

b) Auffrischimpfung alle 10 Jahre

c) Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat

d) Bei Verwendung eines Mumps-Masern-Röteln-Windpocken-Impfstoffes: Gabe einer 2. Dosis

e) Impfung von Jugendlichen ohne Windpockenerkrankung oder -impfung

f) Für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren

g) Jährlich mit aktuellem Impfstoff

h) Für alle Jugendlichen, die bisher nicht geimpft wurden bzw. Komplettierung eines noch unvollständigen Impfschutzes

k) Die nächste fällige Tetanus-Diphtherie-(Td)-Impfung soll einmalig mit einem Td-Pertussis-Poliomyelitis-Impfstoff erfolgen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.central.de

Central Krankenversicherung AG

Hansaring 40-50 • 50670 Köln

Telefon +49 (0)221 1636-0

Fax +49 (0)221 1636-200



Gesundheit bewegt uns.